

4 juli 2016

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in:

- de teelt van aardappelen;
- de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (augurk, courgette, komkommer);
- de bedekte teelt van aubergine;
- de bedekte teelt van tomaat.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste bespuiting en de oogst mag niet korter zijn dan:

24 uur voor aardappelen

3 dagen voor vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en tomaat

In de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en tomaat dient Ranman Top te worden toegepast met 600 – 1200 L water per ha.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die cyazofamid bevatten niet vaker gebruiken dan 6 maal per 12 maanden.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Het gebruik in de bedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en tomaat is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Algemeen

Ranman® Top heeft voornamelijk een preventieve werking en dient daarom ter voorkoming van schimmelaantasting te worden toegepast.

Resistentiemanagement

Uit oogpunt van voorkomen van resistentieontwikkeling dient het middel niet vaker te worden toegepast dan 6 keer per 12 maanden, in bij voorkeur twee blokken van drie toepassingen. Het middel dient afgewisseld te worden met een daartoe toegelaten middel op basis van een werkzame stof met een ander werkingsmechanisme.

Toepassingen

Aardappelen, ter voorkoming van aantasting door aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en van het weer.

Meestal is een eerste bespuiting nodig als de planten elkaar in de rij raken. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het aardappelras de bespuitingen om de 5 tot 10 dagen herhalen. Het moment van (her)bespuiting kan eveneens worden bepaald aan de hand van een waarschuwingssysteem.

Dosering: 0,5 liter Ranman Top per hectare

Bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (augurk, courgette, komkommer), ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*).

Eerste behandeling vanaf 5-blad stadium, bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,042% (42 g middel per 100 L water). Ranman Top toepassen met 600 – 1200 L water per ha.

Bedekte teelt van aubergine, ter voorkoming van aantasting door tomatenziekte (*Phytophthora infestans*).

Eerste behandeling vanaf 5-blad stadium, bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,042% (42 g middel per 100 L water). Ranman Top toepassen met 600 – 1200 L water per ha.

Bedekte teelt van tomaat, ter voorkoming van aantasting door tomatenziekte (*Phytophthora infestans*).

Eerste behandeling vanaf 5-blad stadium, bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,042% (42 g middel per 100 L water). Ranman Top toepassen met 600 – 1200 L water per ha.

Bereiden van de spuitvloeistof

Vul de tank voor de helft met water en voeg al roerend het middel toe.

Vul water bij tot de tank vol is.

Houd tijdens het bespuiten de spuitvloeistof in beweging.